

COS'È IL PAPILLOMAVIRUS?

L'infezione da Papillomavirus è la più frequente infezione sessualmente trasmessa.¹

Il Papillomavirus è stato classificato come il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo.²

Può causare tumori di cervice uterina, ano, vagina, vulva, pene, cavità orale, faringe e laringe.²

COME PUOI PROTEGGERTI?

La vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati in uomini e donne.³

SCEGLI DI VACCINARTI

Vaccinarsi è davvero semplice:

- Somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi per soggetti fino a 14 anni.
 - Somministrazione di tre dosi a 0, 2 e 6 mesi per i soggetti dai 15 anni in poi.
- Attraverso la vaccinazione⁴ contro l'HPV è possibile interrompere all'origine la catena che dall'infezione porta al cancro.⁵

ADERISCI PERIODICAMENTE AI PROGRAMMI DI SCREENING

Partecipare allo screening è l'azione più efficace che una donna possa fare per proteggersi. La cosa più importante è identificare in tempo le alterazioni provocate dal virus, che sono quelle che cerchiamo con il pap test, in caso di test hpv positivo.

LA VACCINAZIONE ANTI-HPV
PROTEGGE IL NOSTRO FUTURO
E QUELLO DEI NOSTRI FIGLI.

SE NON L'HAI ANCORA PRENOTATA,

FALLO SUBITO.

È FONDAMENTALE

perché, insieme allo screening, è uno degli strumenti più efficaci per proteggere la vita dei tuoi figli da pericolosi tumori HPV-correlati.

È GRATUITA

per tutti i ragazzi, maschi e femmine, a partire dagli 11 anni. In molte regioni tale gratuità è garantita fino ai 18 anni e oltre.

È SEMPLICE

perché bastano due sole dosi per chi si vaccina entro i 14 anni. Dai 15 anni le dosi diventano tre.⁵

QUALI SONO LE CONSEGUENZE
DELL'HPV?

La prevalenza di infezione è più alta nelle donne di 20-24 anni.⁶ 4 persone su 5 saranno infettate nel corso della loro vita, sia uomini che donne.⁷

NELLA DONNA

Condilomi genitali | Cancro della cervice uterina
Cancro della vulva e della vagina | Cancro dell'ano
Cancro del distretto testa-collo⁸ | Lesioni pre-cancerose

NELL'UOMO

Condilomi genitali | Tumore anale | Cancro
del distretto testa-collo⁸ | Tumore del pene⁸

- 1 WHO - Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer.
- 2 AACR CANCER PROGRESS REPORT 2020.
- 3 Hartwig et al. Infectious Agents and Cancer (2017) 12:19. doi: 10.1186/s13027-017-0129-6.eCollection 2017.
- 4 Vaccino del Papillomavirus Umano 9-valente (ricombinante, adsorbato).
- 5 Portale Malattie Infettive Ministero della Salute, "Papillomavirus umano (infezione da).
- 6 Harris S, et al. J Infect Dis 2011 Aug 15; 204(4):566-73.
- 7 GISCI. Le 100 domande sull'HPV 2018.
- 8 Il vaccino è indicato per l'immunizzazione attiva di individui a partire da 9 anni di età contro i tipi di HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 e contro le seguenti patologie da virus del Papilloma Umano (Human Papilloma Virus, HPV): Lesioni pre-cancerose e cancri che colpiscono il collo dell'utero, la vulva, la vagina e l'ano causati dai sottotipi di HPV contenuti nel vaccino; condilomi genitali (Condyloma acuminata) causati da tipi specifici di HPV.
- 9 I numeri del cancro in Italia. AIOM, Airtum, 2021.

- Ministero della Salute, Papillomavirus umano (infezione da): <https://www.salute.gov.it/portale/malattieinfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=14&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=1>

- Ministero della Salute. FAQ - tumore della cervice uterina https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=tumore&id=273

- Prevalence and type distribution of high-risk human papillomavirus infection in women undergoing voluntary cervical cancer screening in Italy. Agarossi A, et al. Med Virol. 2009 Mar; 81(3):529-35. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19152401/>

Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto pubblicitario. Campagna autorizzata dal Ministero della Salute in data 14/09/21. IT-GSL-00053-W-07-2023